



LABORATORIOS NOGUEIRAS
ANÁLISIS CLÍNICOS Y AMBIENTALES

www.gustavonogueiras.com.ar / info@gustavonogueiras.com.ar

COPROCULTIVO

PROVEER:

1 tubo con medio de cultivo Stuart - 1 hisopo estéril.

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA:

En un recipiente bien limpio y seco sumergir el hisopo estéril en la materia fecal cuidando de no tocar las paredes del recipiente. Inmediatamente después colocar el hisopo en el tubo con el medio de transporte (Stuart)

OBSERVACIONES:

Cuántos días hace que tiene diarrea?

Evidenció la presencia de sangre y/o moco?

Tomó antibióticos esta semana, cual?

Comentarios:

[NOTA]

La presente información es orientativa, algunos estudios pueden requerir indicaciones especiales.
Actualizada al 10 de Noviembre de 2019.



LABORATORIOS NOGUEIRAS
ANÁLISIS CLÍNICOS Y AMBIENTALES

www.gustavonogueiras.com.ar / info@gustavonogueiras.com.ar

COPROCULTIVO

PROVEER:

1 tubo con medio de cultivo Stuart - 1 hisopo estéril.

RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA:

En un recipiente bien limpio y seco sumergir el hisopo estéril en la materia fecal cuidando de no tocar las paredes del recipiente. Inmediatamente después colocar el hisopo en el tubo con el medio de transporte (Stuart)

OBSERVACIONES:

Cuántos días hace que tiene diarrea?

Evidenció la presencia de sangre y/o moco?

Tomó antibióticos esta semana, cual?

Comentarios:

[NOTA]

La presente información es orientativa, algunos estudios pueden requerir indicaciones especiales.
Actualizada al 10 de Noviembre de 2019.