

www.gustavonogueiras.com.ar / info@gustavonogueiras.com.ar

ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL Y/O LIBRE (PSA)

Ayuno de 8 hs.

Abstinencia sexual: mínino de 72 hs.

Si se ha realizado tacto rectal o ecografía transrectal esperar una semana.

En caso de tener prostatitis, esperar 6-8 semanas luego de la resolución de los síntomas, salvo indicación médica.

Si se ha realizado biopsia rectal o resección de próstata esperar 6 semanas.

Evitar las siguientes conductas dado que todas ellas elevan falsamente el PSA:

- la actividad física intensa en el día previo al estudio (principalmente ciclismo, hipismo o relacionados).
- el estreñimiento o diarrea exagerados con una semana de anticipación

Detallar que fármacos está tomando al momento del ingreso al laboratorio (específicamente si toma Finasteride).

[NOTA]

La presente información es orientativa, algunos estudios pueden requerir indicaciones especiales. Actualizada al 10 de Noviembre de 2019.



www.gustavonogueiras.com.ar / info@gustavonogueiras.com.ar

ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL Y/O LIBRE (PSA)

Ayuno de 8 hs.

Abstinencia sexual: mínino de 72 hs.

Si se ha realizado tacto rectal o ecografía transrectal esperar una semana.

En caso de tener prostatitis, esperar 6-8 semanas luego de la resolución de los síntomas, salvo indicación médica.

Si se ha realizado biopsia rectal o resección de próstata esperar 6 semanas.

Evitar las siguientes conductas dado que todas ellas elevan falsamente el PSA:

- la actividad física intensa en el día previo al estudio (principalmente ciclismo, hipismo o relacionados).
- el estreñimiento o diarrea exagerados con una semana de anticipación

Detallar que fármacos está tomando al momento del ingreso al laboratorio (específicamente si toma Finasteride).

[NOTA]

La presente información es orientativa, algunos estudios pueden requerir indicaciones especiales. Actualizada al 10 de Noviembre de 2019.