



LABORATORIOS NOGUEIRAS
ANÁLISIS CLÍNICOS Y AMBIENTALES

www.gustavonogueiras.com.ar / info@gustavonogueiras.com.ar

DETERMINACIÓN DE PROLACTINA

Ayuno de 8 hs.

Extraer la muestra entre la 1ra y 2da hora después del despertar.

Evitar el estrés.

El paciente debe permanecer en reposo durante los 20 minutos previos a la toma de muestra.

Realizar la extracción entre las 8 y 10 a.m.

En pacientes de sexo femenino salvo indicación médica en contrario, es aconsejable realizar la extracción entre los días 3 y 5 del ciclo.

Consignar FUM.

Es necesario conocer toda la medicación que ingiera el paciente ya que un gran número de drogas pueden generar hiperprolactinemia.

[NOTA] La presente información es orientativa, algunos estudios pueden requerir indicaciones especiales.
Actualizada al 10 de Noviembre de 2019.



LABORATORIOS NOGUEIRAS
ANÁLISIS CLÍNICOS Y AMBIENTALES

www.gustavonogueiras.com.ar / info@gustavonogueiras.com.ar

DETERMINACIÓN DE PROLACTINA

Ayuno de 8 hs.

Extraer la muestra entre la 1ra y 2da hora después del despertar.

Evitar el estrés.

El paciente debe permanecer en reposo durante los 20 minutos previos a la toma de muestra.

Realizar la extracción entre las 8 y 10 a.m.

En pacientes de sexo femenino salvo indicación médica en contrario, es aconsejable realizar la extracción entre los días 3 y 5 del ciclo.

Consignar FUM.

Es necesario conocer toda la medicación que ingiera el paciente ya que un gran número de drogas pueden generar hiperprolactinemia.

[NOTA] La presente información es orientativa, algunos estudios pueden requerir indicaciones especiales.
Actualizada al 10 de Noviembre de 2019.